

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十八 明 周王朱楠 撰

婦人諸疾門

雜病

萬病丸

保慶集方

治婦人久虛血氣衰少怠惰嗜卧百病諸

虛飲食不進精神不足

當歸

四兩

地黃

二兩一方  
熟乾者

右為末蜜和為丸如桐子大每服十五丸食前米飲

下

沈香萬應丸

沈香

另研

沒藥

細研

茯苓

去粗皮

川芎

當歸

去蘆

官桂

去皮

白朮

白芷

白薇

玄胡索

牡丹皮

赤石

脂

藁本

去蘆土

赤芍藥

右為細末煉蜜為丸每錢十丸每服十丸嚼空心溫酒送下專治男子婦人妊娠傷寒諸虛百損或氣滯不勻飲食不化遍身走疼婦人妊娠傷寒身體腫大

者麻黃湯送下妊娠打撲損傷或宿冷物動胎不安  
腹痛不止月水不調或前或後或多或少產前一切  
諸虛百損並用酒下或難產或逆血用當歸湯下或  
死胎在腹不過二丸或胎衣不下三丸即出亦溫酒  
下惡物過多當歸湯下惡物不行紅花湯下自幼年  
無孕每日一服至箇月次有神驗

治婦人血氣

出肘  
後方

用通草煮飲之濃煎三五盞即便通又除寒熱不通

之氣消鼠癭金瘡踠折煮汁釀酒妙

玉露通真丸

出大全良方

治婦人諸疾

半夏

薑汁製炒

人參

各半兩

食茱萸

醋炒

厚朴

製各一兩一分

澤蘭

葉

三兩半

甘草

蟬蛻

炒

白芍藥

蠶蛻

炒用如無以簾故作

三張代之

石膏

白朮

當歸

羌活

熟地黃

洗白焙

茯苓

各二兩

防風

乾薑

柏子仁

蒼朮

白薇

木香

黃耆

川牛膝

附子

白蕪荑

與蟬退同

炒

玄胡索

川芎

藁本

各一兩

川椒

苦荬

各三  
兩 白芷 一兩  
半

右為細末煉蜜為丸每九錢分作十丸切記蜜煉無  
令太過及生也男子婦人諸虛不足狀如勞疾黃者  
煎酒下 血氣燒秤鋌淬酒下 產前安胎用醋湯  
下 產後諸疾用酒或鹽湯下 產前產後瀉用米  
飲送下 男子婦人牙疼用半丸揩疼處良久鹽湯  
嚥下 產前產後血悶用童子小便下 經脉不調用  
紅花酒下 產後風毒生瘡荊芥茶下 冷痰惡心乾嚼

下 婦人子宮久冷崩漏赤白帶下童子小便米醋  
一處緩熱下

治婦人血氣

用紫背金盤草根洗去粗皮焙乾搗羅溫酒調服半  
錢治氣孕婦不可服忌雞魚濕麵羊血等

橘歸丸

出危氏方

治肌膚手足俱有血脈路此怒氣傷肝血

失常經以致如此服之神効

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下

沒藥散

出危氏方

治月信退出皆為禽獸之狀似傷人先將

綿塞陰戶只頓服用沒藥一兩作丸散皆可服即愈  
一方細研溫酒下一錢治內傷血暈臍腹痛者昔有莊  
婦病此危甚其夫來告急服此藥旋即愈痊

治婦人發寒熱不止經久日後四肢堅如石以物擊之  
似鍾磬聲日漸瘦惡菜莫木香等分煎湯飲即日可  
愈

有一婦人小便中忽出糞穢諸方皆不能治因以意度之



用生五苓散利水穀而愈後見夏書云有此病名交腸治以舊幘頭燒灰為末酒服之更不曉其故

懷娠產前產後加減良方

出澹寮方

川芎洗當歸

桂心

不見火

白芍藥

洗

右各為細末取淨各一兩各隨病証加減用產前初覺胎動川芎芍藥各半錢米飲下臨產腹痛甚川芎芍藥當歸各半錢桂末一錢溫酒下扶產婦運行產後惡露未快川芎當歸各半錢童子小便調下仍時

時打醋炭令香不絕則血脈自收安樂無病切不可  
妄投藥恐逐血過多則心虛氣劣三日內只服川芎  
當歸末各一錢童小便調下日三服三日後只服四  
順理中丸空心童子小便吞下七日內補虛當歸川  
芎末各一錢童子小便或米飲調下七日外方可服  
補藥補得太早則留住惡血纔平善四味各半錢童  
子小便調下產後頭昏目暈川芎芍藥當歸末各半  
錢童子小便調下未滿月已滿月四味各半錢水一

盞煎至八分溫服腹痛當歸末一錢桂心末半錢童子小便調下心胸煩悶當歸芍藥各一錢童子小便調下惡露過多桂心芍藥當歸各一錢童子小便調下大便冷用理中丸水一盞煎八分溫服

佛手散

出危氏方

治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾纔產

了未進別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生新血

川芎

二兩

當歸

三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服

一方為粗末每服四錢水七分酒三分同煎至七分服將產前先安排此藥將兩服藥末煎之產了速進之三日內日二服三日外一服 一方名芎歸湯只是此二味等分咬咀水煎專治失血傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血援牙去血不止及一切去血過多心眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉能治之若產後眩暈宜加芍藥服之一名桂香散治產後腹痛不可忍者加桂心等分酒與童子小便

合煎服之立効

一名當歸湯治妊娠子死或未死胎重不安每服用酒水合煎連進數服胎若已死便下若未死其胎自安此經累効萬不失一 一名琥珀散臨月服之則縮胎易產兼治產後諸疾 一名羊肉湯治虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱呼吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉一兩姜十片水二盞煎至六分溫服 一名君臣散治婦人室女心腹疝痛經

脈不調用水煎服若妊娠胎氣不安產後諸疾加酒煎服 一名芎藭散治婦女血氣上喘下腫二味等分為細末每服二錢空心煎艾湯調下又治產後損身血衝心腹脹氣絕者神驗難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥末煎至一盞以上分為二服未効再作產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎服又此藥兼治臟毒每服一錢半入炒槐花末半錢

水一盞至六分無時候服三日取下血塊即愈如產後頭疼加荊芥煎如吐血亦宜服之 治產難多用

百草霜香白芷等分為末名烏金散每服二錢童子小便好醋各一合沸湯浸服止一服見効甚者再服已分免矣 一法用五積散加醋煎亦能催生 若

崩中漏下失血過多不能止用芎歸湯療之不者宜以香附子炒去皮毛為末每兩用甘草一錢清米飲點服名順元湯仍以震靈丹間之 有白帶者於順

元湯加芍藥半兩仍間以白丹或者謂香附子耗氣則不然許學士謂資血養氣婦人仙藥雖羸人亦宜服之 兼治男子婦人吐衄便利及諸症失血用此藥佐以米飲圓百草霜末每服百餘圓或以其他燒灰藥皆能作効不可劇以燥澁之劑止之必致壅遏腐敗却生他証大抵血不能行氣使之然者氣得其平則血循故道必無妄行之患矣香附子善能導氣用之每得其宜



二聖散

出大全良方

治產前服之則安胎產後惡血不盡胎

衣不下皆治之

川芎

羌活

等分

右為細末每服二大錢水七分盞酒少許煎七沸溫服

二聖大寶琥珀散

出大全良方

生地黄

一斤生薑

一斤取自然汁將地黃汁炒生薑滓薑汁炒地黃滓各稍乾焙為末

當歸

川芎

牡丹皮

芍藥

莪朮

蒲黃

香白芷

羌活

八味各炒

桂心

不見火

熟地黄

炒

右各一兩同前二味為細末於瓷合內收之婦人冷氣痛并血海不調隔氣炒薑酒下二錢產後包衣不下煖酒調下二錢產婦臨月日進三服滑胎易產溫調二錢產後血犯心眼見鬼神用童子小便半盞酒半盞同煎調服婦人久服則顏色紅白無血來相攻一生無子者久服則有孕此藥治療婦人百病空心日午食前一日二服產後百病並煖酒下

一捻金散

出仁存方

治婦人產前產後百病疼痛不可忍者

此藥

馬蘭草

醋炒

麒麟竭

沒藥

乳香

各半兩

川當歸

去蘆

一兩

右為細末每服二五錢熱酒調下

保安丸

出海上方

治產前產後諸症列於後

白豆冠

赤茯苓

牡丹皮

紅芍藥

沈香

訶子皮

檳榔

硃砂

石茱萸

各三錢

馬明退

炒

生地黃

各一兩

人參

當歸

官桂

牛膝

酒浸

白芷

木香

藁本

麻黃

去節

黑附子

炮

川芎

細辛

去葉

蘭香葉

甘草

桔梗

去蘆

寒水石

燒粉

防風

去蘆

蟬

壳

乳香

沒藥

白朮

各五錢

龍腦

一錢

射香

少許

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心細嚼  
溫酒送下治証于後八分淋血緊不過三丸胎衣不  
下只三丸產前產後腹痛只一丸子死腹中只三丸  
臍下如刀刺只一丸遍身生黑斑只一丸經脈不通

只一丸產前產後傷寒只一丸臨產時一丸則易生  
返魂丹治婦人胎前產後諸疾危証

舊黑箭野天麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花形名荒  
尉子是也又名盆母又名大扎又名貞尉又名肩蟾  
四五月採取陰乾用葉及花子磁器研為末煉蜜丸  
如彈子大隨後治証嚼服其根燒存性為末酒調服  
之功與黑神散不相上下胎前臍腹作痛或作聲者  
溫米飲下胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止

水煎秦艽糯米湯下或當歸湯亦可如產時先用一  
丸以童子小便化下安魂定魄氣血自然調順諸病  
不生又能破血止痛養脈息調經絡溫酒送下產後  
胎衣不下落在胞中及橫生不順死胎經日不下者  
脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下產後中風牙關緊急  
半身不遂失音不語童子小使用無灰酒各半下產後  
咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩脇痛舉  
動失力者溫酒下產後兩太陽痛呵欠心忪氣短肌

體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛溫  
米飲湯下產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見  
鬼神狂言不省人事薄荷自然汁如無生者濃煎薄  
荷湯下及童子小便酒各半亦可也產後垢面顏赤  
五心煩熱或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗  
者童子小便酒各半下溫薄荷自然汁亦可產後餘  
血惡露不盡結滯腸臍刺痛惡物上衝心胃主悶者  
童子小便酒各半下產後大小便不通煩燥口苦者

薄荷自然汁如無生薄荷濃煎薄荷湯下產後瀉血  
者少煎棗湯下產後白帶下者煎膠艾湯下月水不  
調溫酒下血崩漏下溫酒下婦人久無子息溫酒下  
服之十九至二十九亦能主喜 一方用花花子陰  
乾搗末煉蜜丸如彈子大每服一丸一子死腹中蓋  
因卒病臟腑熱極蒸其胎是其子死也蓋子死不居  
子宮或墮胎腹間冷痛小便沫出腹脹四肢亦冷爪  
甲青是也或臨產之時此藥安魂定魄血氣自然調



順諸疾不生破血補虛止痛養血氣調經絡用童子  
小便各七分化下二凡產難者胞已食母之血十月  
滿足則餘血結成塊俗呼為兒枕欲產之時血塊先  
破敗血裏其子是以難產或產後惡物不盡臍腹刺  
痛惡上衝心胸主悶用童便酒各七分化下三垢面  
顏赤胎衣不下既產了臟腑虛羸五心煩燥血流如  
水中則難出發寒熱有冷汗出但去其敗血其衣自  
出如帶斷了服此藥下或橫生不順心悶欲死者童

便酒各七分化下薄荷自然汁鹽湯亦可四產後三  
日起卧不得眼前黑暗生花蓋產後血氣未定運走  
五臟入肝則目昏俗為暗風醫家以風治之或血熱  
口乾煩渴心悶亂見鬼神狂言妄語不省人事童便  
酒各七分薄荷自然汁亦可五產後口乾心悶及煩  
渴者血氣未定即食熱麪積滯在內以致熱燥煩渴  
者俗為胸膈壅塞或兩太陽穴痛呵欠怔忡氣短身  
體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛甚

者溫米飲童子小便各七分化下六產後四肢浮腫  
及寒熱者蓋因敗血流入五臟滲入四肢停留日久  
化為膿狀氣喘或小便澀或咳嗽胸膈不利惡心口  
吐酸水兩脇疼痛舉動乏力溫酒化下七產後寒熱  
往來蓋因敗血入心則熱入皮脾則寒狀熱瘧臍腹  
作痛或作聲溫米飲化下桂枝湯亦可八產難中風  
牙關緊急半身不遂失音不語童便酒各七分化下  
產後利未經月滿或誤食物下與血相攻擊前所積

受濕因此敗血相攻煎棗湯下十產後大便秘結口  
苦煩渴非時不與以敗血衝心而蔽其心孔童便酒  
各七分化下薄荷汁亦可十一產後遍身疼痛百節  
開張血乘流入腸中停留不散臍腹疼痛米飲化下  
十二產後崩中漏下不止蓋是傷酸物狀如雞肝脊  
背倦悶煎糯米秦朮湯化下當歸桂枝湯亦可十三  
產後未經月滿血氣不通蓋是月水未還或食熱麪  
壅結成塊喘嗽四肢無力多睡而汗出不止月水不

調為骨蒸勞便服此藥童便各七分化下十四產後  
吐逆不止蓋因敗血停於脾胃即發吐逆胸膈虛脹  
俗為翻胃溫酒化下十五產後鼻衄口乾舌黑蓋因  
入心臟熱則舌黑鼻衄也童子小便各七分化下十  
六產後赤白帶下煎秦艽湯下十七產後氣急喉中  
猫聲者蓋因敗血衝心入喉中萬無一瘥矣十八產  
後中風者蓋因未經七日勞動則百日之中傷其房  
事中風初病之狀眼澁腰強筋急角弓反張牙關緊

急若此者皆自傷犯耳十九產後面色黑及遍身生黑靨者乃敗血入其皮膚萬無一瘥矣

烏雞煎

出三因方

治婦人百病

吳茱萸 良薑 白薑 當歸 赤芍藥 延胡

索

炒

破故紙

川椒

炒

生乾地黄

劉寄奴

蓬

莪茂

橘紅

青皮

川芎

各一兩

熟艾

二兩

荷葉灰

四兩

右為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服三五十丸湯

使於後月經不通紅花蘇木酒下白帶牡蠣粉調酒  
下子宮久冷白茯苓煎湯下赤帶建茶清下血崩豆  
淋酒調棉花灰下胎不安和蜜好酒下腸風陳米飲  
調百草霜下心疼菖蒲煎酒下漏胎下血烏梅溫酒  
下耳聾蠟點茶下胎死不動斑蝥三四箇煎酒下腰  
脚痛當歸酒下胎衣不下芸臺研水下頭風薄荷點  
茶下血風眼黑豆甘草湯下生瘡地黃湯下身體疼  
痛黃耆末調酒送下四肢浮腫射香湯下咳嗽喘滿

杏仁桑白皮湯下腹痛芍藥調酒下產前後痢白者  
乾薑湯下赤者甘草湯下赤白雜者二宜湯下常服  
酸湯下任下並空心食前服之

大効琥珀散

一名烏藥散

治婦人心滿迷悶臍腹掣撮疼痛

氣急氣悶月信不調等疾

方見室女月水不調類

通真丸

出危氏方

隨證加減

當歸

去尾

蒼朮

切炒

肉桂

防風

川芎

人參

白

芍藥

白薇

去土

熟地黃

酒炒

牡丹皮

茴香

白朮



白茯苓

桔梗

附子

炮

澤蘭葉

各等分

右為末煉蜜丸每服一丸血崩經脈不勻赤白帶下  
炒當歸酒下血風癰疹瘰癧薄荷蜜湯冷氣塊築心  
腹嘔逆反胃炒鹽湯下腸風瀉血赤白痢月信不止  
米飲下血風勞倦青蒿酒下頭疼眼花酒下月信不  
行室女紅脈不通產後中風不語迷悶五丸用紅花  
蘇木湯治漏下血氣刺心腹脹滿炒薑酒下

育真丹

出簡易方

治婦人三十六種風疾下臟久虛沈寒痼

冷帶下五色變易不定漸見瘦弱

代赭石 紫石英 赤石脂 左顧牡蠣

去二頭

右為末米醋和成劑分為六錠入甘鍋內燒通紅半時辰傾出放冷搗為末次入

乳香 別研 茴香 微炒 乾薑 炮 五靈脂 去砂石各三兩

右為末却入前末和勻醋煮糯米糊為丸如梧桐子大每服二十九煎茴香酒下空心服

艾煎丸

出經驗良方

治婦女諸疾腹痛赤白帶下

香附子

艾葉

各四兩

蔓荊子

神麴

枳殼

各當

歸

各一兩

茱萸

莪朮

各一兩

右用醋一大碗慢火煮香附子艾葉以醋盡為度揀

去艾葉入糯米粉糊捻作餅子日乾同前藥為末醋

煮麴糊丸如梧桐子大每服五十丸米飲醋湯任湯

送下

補陰丹

出家藏方

治婦人百疾經候不勻或崩漏不止腰腿

沉重臍腹作痛潮熱往來虛煩自汗中滿氣短嘔噦

不時肢體酸痛不思飲食日漸瘦弱此藥潤肌體悅  
顏色調營衛逐風寒進飲食

熟乾地黄

洗焙

生乾地黄

各七兩半

白朮

五錢

蒼朮

五兩米泔浸一

宿 藁本

去土

牡丹皮

當歸

四味洗焙

秦艽

四味各十兩

細辛

去葉土

蠶退紙

燒灰留性七兩

肉桂

去粗皮八兩

甘草

炙六兩半

黃卷

焙乾秤炒取出六兩半

枳殼

麩炒去穰六兩

陳橘皮

去白六兩

羌活

去蘆頭

香白芷

乾薑

炮三味各五錢

糯米

三升炒黑色大烟出

白茯苓

苓

去皮一兩

右件為細末煉蜜為丸每兩作一十丸每服溫酒化下醋湯亦得空心食前服

內補黃耆湯

出危氏方

治婦人七傷身體疼痛小腹急滿面

目黃黑不能飲食並諸虛之不足少氣心悸不安方

黃耆

三兩當歸

三兩芍藥

三兩乾薑

四兩乾地黄

半夏

各三

兩人參

桂心

遠志

麥門冬

去心

甘草

五味

子白朮

茯苓

澤瀉

各二兩

大棗

三十枚

右咬咀為散以水一斗半煮取三升去滓每一服五

合日三夜一服

治女人風虛血悶

出本草

以羊肉髓和酒服之

阿膠煮散

出生育寶鑑方

治婦人宮臟百病

阿膠

大芎

人參

白朮

五味子

麥門冬

當歸

茯苓

黃耆

續斷

乾地黄

各一兩

甘草

半兩

右細剉為煮散每劑八銖婦人宮臟妄致肝氣攻衝  
喘促咳嗽入水五七藥煎空心熱服若是血臟冷痛

赤白帶下加生薑兩片大棗一枚煎服若補血入枸  
杞子覆盆子煎若嘔逆不思飲食加草豆蔻煎或丁  
香二十枚煎服若孕婦不安加桑寄生枝一兩細剉  
勻拌煎服若產後血多及半產下血宮臟全虛加白  
薇半兩微炙從蓉一兩細剉拌勻煎服若是久患宮  
臟骨節腰腿兩脇逆痛四肢少力常患風寒有如勞  
狀候加木香半兩鼈甲一兩醋炙柴胡一兩並剉拌  
之每服三錢入生薑三片水兩盞如茶法煎至七分

空心熱服號萬全不傳方

繹皮丸

出朱氏集驗方

治婦人百病大有効驗

當歸

四兩洗淨好酒浸一宿漉出焙乾再浸酒盡為度

赤芍藥

人參

白芍藥

肉桂

去皮

白朮

益智仁

白微

五靈

脂附子

陳皮

青皮

各二兩

牡蠣

煨

赤石脂

香附子

玄胡索

牡丹皮

去木

蒼朮

敗醬

京

三稜

蓬莪朮

劉寄奴

艾葉

澤蘭

生乾

地黃

熟乾地黃

各兩

蒲黃

三兩

雄黑豆

十兩

九



右件將蒼朮敗醬陳皮青皮京三稜莪朮劉寄奴艾  
葉澤蘭小雄黑豆等十味用好醋煮藥候黑豆爛熟  
為度醋少又添煮為佳焙乾和衆藥為細末醋煮麪  
糊為丸如梧桐子大每服四五十九空心薑酒或艾  
醋湯下有孕不可服

玉仙散

出鮑  
氏方

治婦人諸疾

香附子

瓦器炒黑  
色勿焦

白芍藥

一兩  
甘草一錢

右為末每服三錢沸湯下血崩不止手足麻木不仁竹

葉湯下月水不行加生薑炒當歸煎木通湯下

月水不勻當歸酒下頻頻下胎血脉不住米飲下氣

痛及老婦人忽下血加炒薑黃炒陳皮任下

勝金丹

出王氏博劑方

治婦人血海虛冷臍腹痛黃瘦飲食進

退多因發煩產前後諸疾依法服大効

大黃

三兩用米醋浸兩宿以竹刀細切於甑上蒸九度研為糊

當歸

蒲黃

官桂

去皮乾地黃

以醋微炒

赤芍藥

各半兩

芫花

一分下米醋內炒令

黃劉寄奴

一分

蓬莪茂

乾

芎

延胡索

銀石器內炒

杜牛膝

地龍

去土醋炒過  
已上各半兩

右為末入大黃膏內和丸如雞頭大早辰臨卧溫酒  
化下一丸如產後有疾炒薑酒化下一丸如月數未  
多勿服

大琥珀丸

出王氏  
博濟方

治婦人百病

木香

二兩細切  
微炒

琥珀

二兩生用

北亭

一兩以熱湯化為水  
澄去砂石取青者白

磁器內  
熬

京芎

二兩炒

官桂

一兩去皮  
不見火

當歸

一兩去蘆  
頭各炒

白殭蠶

一兩直者去絲薑  
汁浸於碗內焙乾

沒藥

一兩生用  
薑黃

一兩炒  
蟬

殼

去足酒洗  
淨用一兩

右一十味依法修事一處為末別以乳香一兩用水  
應任水內入白麴為丸如菉豆大以好辰砂一兩半  
射香一錢為衣分為三度上之貴色勻也治婦人室  
女百病當服三十丸溫酒醋湯任下舊病十五丸至  
二十九日二服赤白帶下煎荊芥酒下脈不通虎杖  
芎蜜同煎酒下心氣痛生薑醋湯下上喘咳嗽訶子  
人參湯下五勞烏梅鼈甲葱白煎酒下血邪發狂磨

刀水磨生犀下鉛白霜亦得四肢癢痒遍身生瘡及  
五痔何首烏煎酒下血海積冷絞痛食後氣脹腰腳  
無力炒薑酒下血暈悶亂童子小便酒各半盞煎服  
溫下血崩艾葉煎酒下臨產作陣血閉悶亂胎息不  
順子死腹中生衣不下及催生並用生雞子清一個  
熱酒沖調下小產後敗血奔心口噤舌強寒熱發渴  
頭面浮腫坐臥不得百節酸疼生地黃生薑汁各少  
許入童子小便酒各半盞同煎三五沸去滓溫服產

後重風炮烏頭二箇白殭蠶少許為末酒煎半盞下  
產後瀝淋不止口苦盜汗乾荷葉阿膠煎酒下頭面  
及四肢腫痛筋縮拘急延胡索酒下血癥結塊刺痛  
難忍煎當歸酒下赤白等痢熱陳米飲下有孕不得  
服

保生丸

出衛生家寶方

治婦人胎前產後一切等疾

知母

細辛

石膏

火炮

白薑

火炮

血竭

細研

黃芩

綿黃耆

洗蜜水浸一宿炙

肉桂

去皮不見火

沒藥

研

川當歸

去蘆

洗 貝母 生地黄 淨洗防風 去蘆已上 甘草 一分 糯

米 炒令 微黃 黑豆 微炒 大麻子 瓦上炒已 川椒 去子炒 石

斛 淨洗剉蜜水浸一宿以上各半兩

右件各為末煉蜜為丸搗多杵為妙一兩分為五丸  
婦人胎前產後衆疾常服調氣進食在孕兩三月可  
服安胎益血不生諸疾孩子易生一九分作三服溫  
酒細嚼下或月候不調當歸酒下子難生死腹中橫  
生倒產衣不下死絕不語但看心頭有氣暖煎棗湯

化開灌入口中立瘥產後惡血攻刺刺腹脇腰疼炒  
豆淋酒下增寒壯熱嘔逆半身不遂及暈血崩帶下  
不止狂言飲食少味日漸黃瘦並酒下忌生冷毒物  
黃金散治婦人產前後諸疾

生薑

一斤四兩薄切先炒令水氣盡再入米醋二升熬乾為度

當歸

白芍藥

熟地黄

洗

桂心

去皮

大黃

炮各

一兩

右五味淨洗細剉都炒乾同前炒薑為細末婦人產  
後敗血攻心暈悶欲死微有氣存細擦老薑炒令水



氣盡用童子小便兩盞同煎百沸傾出漉去薑滓調藥二大錢熱服立醒或口噤以物挑開灌藥如分免後產母雖無病亦依前湯使調藥服之便服白粥壓下即不生血暈之患或胎不下者一服即下產後仍每日進藥三服服後五七日一服使逐去惡血久後百病不生產前後血氣及婦人尋常氣疾痛刺不可忍者並用無灰酒調服

牡丹散 治婦人脾血臟冷氣不和心胸煩悶不思飲

食四肢少力頭目昏身體疼

牡丹 芍藥 白芷 乾薑 當歸 延胡索

陳皮

去穢

官桂

去皮

烏藥

苦杖

紅花

川芎

各一兩

右件十二味並生杵為末每服一錢半用薑二片酒水各半盞同煎至七分溫服如初生產後每日三服一七日後漸減服數如吃藥後腹內些小疼痛請不怪如喫至滿月永無病生

當歸散 治宮胃虛冷

當歸 附子

桂 各半

白朮 一兩

甘草 一分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓空心服  
治婦人使性常多鬱怒傷損肝心止氣心氣結澁因而  
積涎怒而氣逆涎隨氣上其病狀聞得心前昏悶潰  
亂不快遂有一塊物上觸到咽喉即手足俱冷口噤  
不開不省人事宜服此方忽懷孕而得此疾其治之  
與此方不同自有方在妊娠藥方中也

藿香

細辛

羌活

芎

菖蒲

各一分

獨活

牽

牛各二半夏三分  
兩生

右細剉為末內有牽牛半夏自作一處杵為末煎前面藥三錢取汁調牽牛半夏末一錢半為一服若吐涎即安若未吐如人行一里再進一服

橄欖散 治婦人口乾煩燥止渴潤咽喉

川百葉煎 烏梅 甘草 石膏各等分

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸噙化下

沖和補氣湯 十月十二日嚴霜作時有一婦人病四

肢無力痿厥

溫熱在下焦也

醋心者

濁氣不降欲為滿也

合目麻木者

陽道不行也

惡風寒者

上焦之分皮膚中氣不行也

開目不麻者

助陽道行

故陰寒之氣少退也

頭目眩運

風氣下陷於血分不得伸越而作也

近火則有之

羌活

七分獨活

三分柴胡

二人參

甘草

炙半錢

白芍藥

三錢黃耆

二錢

白朮

二錢

蒼朮

二錢

橘皮

二錢

黃蘗

三分

黃連

一分

澤瀉

一錢

猪苓

一錢

麴

二分

木香

草豆蔻

各二分

麻黃

不去

節二分

升麻

半錢

當歸身

三分

右件分作二服每服水二盞去滓稍熱服食遠神効

麻黃桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木睡覺則少

減開目則忽而全愈又忽而麻木因心中煩惱遍身  
骨節痛身體沈重飲食減少腹中氣不運轉

黃耆

錢半

人參

錢半

炙甘草

分三

麻黃

錢半

不去節

桂枝

分三

升

麻

分三

白朮

分三

半夏

洗七次

生薑

分一

陳皮

分二

厚朴

分二

分二

木香

分一

茯苓

分三

澤瀉

分三

黃蘗

分二

黑附子

分二

草豆蔻

分二

分二

仁

分二

右都作一服煎法如常

補氣升陽和中湯 治六脈俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱濕陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝少而夜甚覺而開目則麻木漸退而絕無常開其目此證不得懼其麻木不敢合眼致不得安息重時有痰嗽覺中常似有痰而不利時有躁作氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼是為苦楚觀其色脈形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜

重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽道行陽氣布週遍身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然細按之有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩繫縛之人釋之覺麻木不敢動久則自己以此驗之非有風邪乃氣不行也治之當補肺中之氣麻木自去矣知經脈中陰火乘其陽分火動於中為麻木也當無去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也則



實其皮毛以溫劑身重脈緩者濕氣伏匿而作也時  
見躁作當升陽助氣益血微瀉陰火與濕通行經脈  
調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也補氣升  
陽和中湯主之

黃耆

錢五

人參

錢三

炙甘草

兩四

生草稍

錢一

白朮

錢二

當歸身

錢二

橘紅

錢二

佛耳草

錢四

白芍藥

錢三

草豆蔻仁

錢一

一錢益陽  
表外寒

酒黃柏

錢一

蒼朮

錢半

白茯苓

錢一

除濕  
導火澤瀉

錢二

升麻

錢一

助經

錢一

右咬咀每服五錢煎法如常已時間服之

一方

出海上方

專治婦人血敗

佛尼降真

二兩

右剉碎每服水一大碗煎至半椀空心連進二服

治婦人血露

出本草

以蠶退紙燒灰服之

治婦人懷子不乳

出本草

史記云菑川王美人懷子而不乳來召淳于意性飲

意以葭藹藥一撮酒飲之旋乳意復診其脈而脈躁

躁者有餘病即飲消石一劑出血血如豆比五六枚

通血脈破血

出本草

取黃麻汁煮粥食之

治下閉血瘀女子帶

出本草

以沙牛角腮燒灰煖酒服

治婦人一切血病產婦一切傷損

方見本門虛損類益母煎出本草

班珠藤

出本草

主風血羸瘦婦人諸疾

用班珠藤浸酒服

綖木

出本草

主風血羸瘦補腰腳益陽道

以綖木浸酒服

木香丸

出危氏方

治婦人氣虛不能制血凡婦人稟受怯弱

其證有氣虛者血虛者氣虛者則不能管攝陰血時  
腹淋漓下濁白淫經候不調漏下五色形體瘦瘁飲  
食減少不成胎也

木香

半兩

白茯苓

茴香

炒黃

益智仁

醋浸

陳皮

去白各一

兩

蒼朮

三兩泔浸三夕焙乾

香附子

二兩淨酒浸三夕焙乾

右末酒煮麴糊為丸如桐子大每服五十丸不拘時  
候米飲多下服收效尤速

茸歸丸

出危氏方

治婦人血虛者胃之水氣不足胃中煩作

熱手足掌心熱四肢煩疼或寒熱夜出盜汗口乾舌

燥此是血虛當補其血

嫩鹿茸

煨去毛  
酥塗炙

川芎

人參

肉蓯蓉

烏梅肉

肉桂

柏子仁

牡丹皮

京芍藥

已上各  
一兩

當

歸

半兩  
洗

黃耆

二兩  
蜜炙

紫石英

一兩

大熟地黄

洗淨再  
以酒蒸二次

焙乾  
一兩

右末米打薄糊為丸如梧桐子大每服五十丸至六

十丸空心淡醋湯下

黃耆白朮散

出衛生寶鑑方

治婦人四肢沈重自汗上至頭際

項而還惡風燥熱

黃耆

一兩

白朮

半兩

黃蘗

酒製

細辛

三錢

川芎

五分

羌活

二錢

人參

半兩

吳茱萸

五分

當歸

半錢

柴胡

一錢

升麻

一錢

五味

子

三個

右件咬咀每服半兩水二大盞生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前腹中不快加炙甘草一錢汗出不

止加黃柏半錢

玄胡苦練湯

出衛生寶鑑方

治臍下冷撮痛陰冷大寒

肉桂

三分

附子

三分

熟地黄

錢一

炙甘草

五分

玄胡

二分

黃柏

三分為引用

苦練子

二分

右㕮咀都作一服水四盞煎至一盞去滓稍熱服空心食前

千金丸

出保慶集方

治產前產後一切風冷血氣等疾產前

胎氣不安腰腹多疼四肢昏倦妊娠臨月預合下每

日空心一服臨產五臟不通產蓐中不生諸疾無治  
產後惡血不盡及胎衣不下憎寒壯熱吐逆煩悶皮  
膚虛腫或血暈狂迷眼見神鬼能補勻血氣

金釵石斛

別搗為末

秦朮

細辛

川椒

去子微炒

防風

貝母

麩炒微黃

乾薑

炮

大豆蘗

盒生芽長二寸焙乾

生乾地

黃切細糯米

炒

甘草

炙已上各等分

當歸

切焙

大麻仁

黃芩

石膏

已上各等分

右精擇為末以煉蜜成劑入木臼中杵一千下分為



七十二丸擇破除天德月德合日合每服一九溫酒  
調下產後產前赤白帶下溫酒嚼下產前後血氣薄  
荷湯嚼下月信不通當歸酒下臨產艱難或三五日  
難產及胎衣不下子死腹中橫生倒產死絕不語但  
心頭有熱氣用藥一九京棗湯研化灌之下喉立差  
產後惡血不盡臍腹疼痛嘔吐壯熱憎寒煩悶月候  
不調或多或少肢體虛怠皮膚浮腫產血不止虛勞  
中風口禁不語半身不遂產前後赤白痢大小便秘

流血暈狂語頭痛面色痿黃漸成勞瘵飲食無味並  
溫酒研下一丸產前臨月每旦一丸至臨產當歸酒  
下一兩丸催生五臟不痛子易生

當歸荊芥散

出家  
藏方

治女人血氣攻注四肢疼痛飲食減

少胸滿惡心日漸羸瘦及血海虛冷經脈不調夜夢  
多驚癢癖氣塊並皆治之

荊芥穗 川芎

人參

去頭  
蘆

當歸

洗  
焙

桔梗

去蘆  
頭

附

子

炮去  
皮臍

柴胡

去  
苗

防風

去  
蘆

丁香

白芍藥

蒲黃

炒

鼈甲

醋炙令黃

香白芷

牛膝

酒浸一宿焙乾

白薇

肉桂

皮去

半夏

湯洗七次

羌活

去蘆

杏仁

湯洗去皮麤炒

木香

白茯苓

皮去

續斷

檳榔

沒藥

別研

肉蓯蓉

酒浸一宿焙

柏子仁

地骨皮

已上各等分

右件為細末每服三錢水一盞半生薑五片煎至八

分溫服不拘時候

烏金散

出危氏方

治身熱口燥頭痛如破氣塊築痛下黃水

如葵汁

百草霜

銚內炒烟  
盡為度

紫金皮

米泔浸煮  
熟炒焦色

粉草

炙

右為末每服二錢艾湯調或用淡醋湯空心服 又  
方加入住紅蘇根金擢子根心嘈猪血入鹽炒酒吐  
紅飯飲勻月水木瓜當歸浸酒赤白帶下葱白連根  
煎酒血海虛冷下白不止用鯉魚一個去腸肚不去  
鱗將油髮一塊入魚肚內黃泥固濟炭灰內燒烟淡  
淡留性去泥碾為末後入當歸頭甘草炒為末每服  
一錢用舊酒調下

養榮湯

出楊氏家藏方

治婦人血海虛弱氣不升降心忪恍惚

時多驚悸或發虛熱經候不調不進飲食

白芍藥

川芎

熟乾地黄

洗焙

當歸

酒浸一宿焙乾

青皮

去薑黃

牡丹皮

五加皮

海桐皮

香白芷

十味牛膝

酒浸一宿焙乾

延胡索

沒藥

五靈脂

去石肉

桂

去皮已上五味各一分

右件咬咀每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一枚

煎至一盞去滓溫服不拘時候

黃耆地黃丸

出衛生家寶

治婦人血虛肌瘦面黃腹脹飲食

不進血或崩漏腰脚痠疼臍腹疔痛榮衛不足渾身倦怠此藥活血駐顏滋潤皮膚

黃耆

一兩蜜炙

當歸

去蘆酒浸洗三兩

川芎

熟乾地黃

酒浸二兩

鵝卵礬朱

二兩火煨通赤盆覆地上出火毒

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒

鹽湯下

麝珀散

出衛生家寶

治婦人諸虛不足產前產後等疾大効

獨莖川當歸

一兩去蘆頭并稍洗以好酒浸一次日漉出控乾切作薄片子火焙令乾

須稱一兩用

紫團人參

去蘆頭稱八錢切作片子慢火焙乾琥珀四錢別研極細

末候衆藥成末子却入琥珀末一處拌勻

柏子仁

半兩揀去殼如衆藥碾成末子即將柏子

仁一味入碾中碾一二三百碾却將衆藥末子又在碾內一處又同碾一二百碾抄出再用紗羅子

隔篩餘者藥碾又羅篩

芎藭

一兩剉碎焙乾官桂削去粗皮剉碎不得見火只於

日曬乾三錢半令碾作細末却拌和入藥尤妙

甘草

一兩火上微炙透熟地黃二兩

須用酒漉勻九蒸九晒

白朮

乾好者剉碎焙乾稱八錢白茯苓一兩剉碎微焙

右件為細末每服三大錢水一中盞半煎至八分去

滓乘熱再入射香少許攪勻急以蓋子蓋定藥少時  
通口服空心食前如急要服便服抄二平錢泡射香  
湯調下酒浸服亦得忌生冷油膩硬物

清肺湯

出簡易方

治婦人肺熱生風面癰用

當歸

防風

大川芎

剉

生地黄

洗切

赤芍藥

剉

黃

著

去根

荊芥穗

各一分

甘草

炙半兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分食後通服日三

服



滋陰萬病丸

出十便良方

治勞虛血弱肌肉枯燥手足多煩

肢節痠疼髮脫落面少顏色腹中拘急痛引腰背  
去血過多崩傷內竭胸中氣短晝夜不得眠情思不  
樂怔忡多汗

熟地黄

當歸

各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸米飲  
下不以時

地髓煎丸

通經脈補虛弱強腳膝潤肌膚

生地黄

一斤  
取汁

牛膝

製了末  
二兩

右二件攪勻銀石器中熬可圓即丸如梧桐子大每服三十丸食前酒下

渾身碎痛飲子 治婦人勞倦

虎骨

五銖

茯苓

甘草

防風

藁本

白芷

各一銖

當歸

芍藥

續斷

吳朮

附子

茯苓

各三銖

右為粗末生薑棗鍊服不拘時

黃耆飲子 屢經大効方治婦人血氣不足夜間虛乏

有汗倦怠少力

黃耆 五味子 當歸 茯苓 各半兩 芍藥 遠志

麥子 人參 吳朮 各一分 甘草 三銖

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓不拘時服神驗

地黃散 治婦人血少氣寒面色青白方

地黃 乾薑 各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下不以時

治婦人血海虛憊面無顏色飲食減少

炙艾綿 蒼朮 吳茱萸 白朮

各一分 當歸半兩

右為細末煉醋煮麪糊丸如梧桐子大空心米湯下

二十九

治一切婦人血海虛弱將養不到變成勞候其狀面色青黑肌體消瘦多困少力吃食減少口無滋味經後過少多時須汗頻發寒熱兩脇脹滿忽時氣痛

當歸 澤蘭 五味子 黃耆 官桂

去木香皮

山茱萸

獨活

各一分

芍

牛膝

石斛

乾地黄

人參

各半兩

藿香

三銖

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下五

十丸

治婦人血海虛冷肌肉黃瘁飲食減少腹中非時刺痛  
或有氣塊非時走作不定少有嗣續

延胡索

桑寄生

當歸

牛膝

各半兩

獨活

川

芎

五味子

防風

藁本

白芷

木香

鼈

甲

醋炙各  
一分

右為細末作一處相滾令勻煉蜜丸如梧桐子大早  
朝空心鹽湯下三十丸至五十丸

溫濕阿膠丸 除風冷煖血海治月事過多血氣諸疾  
方

阿膠 附子 熟乾地黄 白芍藥 艾葉

各二兩

四兩

右五味同米醋二升一處煮令盡醋用烈火焙燥碾

為細末酒煮麴糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒送下不拘時候

芎藭湯 調益榮衛滋養血氣治諸疾血虛羸短氣腹中疼痛面體少色心忪驚悸虛煩汗出時發寒熱倦久無力妊娠溫和胞絡助氣產後順行餘穢滋生新血

芎 當歸

等分

右為粗末每服三錢水一盞半入酒少許煎至七分

去滓食前服一方加縮砂

桑黃丸 治積煖血海女人諸疾補益

桑黃

半斤牛膝

酒浸切焙一斤

桃仁

去皮尖雙仁炒研如膏

麥蘖

炒白

木

陳麴

炒

當歸

切焙

大黃

剉炒各半斤

生地黄

十斤絞自然汁

生薑

十斤絞自然汁

右搗羅七味為末與桃仁膏同入二汁內拌勻磁器

盛甑內蒸一日取出焙乾搗羅末煉蜜丸如梧桐子

大每服二十丸空腹溫酒下漸加至三十丸



治室女月露滯澁心煩恍惚

用鉛白霜研細為散每服一錢溫地黃汁一合調下  
生乾地黃煎湯調服亦得

治一切疾病

取預知子人每日服二七粒患者服不過二千粒永  
瘥

治女子赤白沃止血養精神保血脈益氣嗜飲食利人

口齒去頭中熱風

出本草

用水斬和醋作釐殖及煮食之並亦得能滋人患蠱  
瘕不可食

治婦人瘕子藏急痛

出本  
草

以七月七日取槐實搗汁同器盛之日煎令可丸  
大如鼠屎內竅中三易乃愈

鬼縛藤

出本  
草

去風血

以鬼藤浸酒服之

治血氣逆心煩滿用羚羊角或水羊角燒為末水服方

寸匕

治婦人十二疾

出本草

以狗陰卵燒灰服之

治血氣

出本草

取蝾螈血飲之若無生血取其皮甲名鼈皮煎汁代之

治婦人血病塞上

出本草

以白馬蹄燒烟盡取灰末酒服方寸匕日三夜一

治女子胞中餘血不盡欲死者

以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚効

治婦人傷子帶下諸血著臍腹中瘀痛身體黃疸欲死  
用乾地黄大黃各四兩杏仁四十枚春酒五升合煮  
取三升分三服日三夜一

治腳膝風濕產後少力多疼痛及陰汗

出御藥方

用燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處

理中茯苓湯

出試効方

單治婦人六十歲病振寒戰慄

太陽寒水

客也呵欠嚏噴

足少陽溢也

口亡津液

足陽明不足也

心下急痛而

痞

手以陰受寒也故急痛足太陰血滯為痞

身熱近火

熱在皮表寒在骨髓亦有拒寒戰慄

也

臍下惡寒

丹田有寒也

渾身黃而白睛黃

寒濕也以餘證之治其寒

也

溺黃赤而黑頻數

寒濕勝也

自病來身重如山便著牀

枕

至陰濕勝也

其脈診得在右關并尺命門中得弦而急

極細雜之以洪而極緩

弦急為寒加之以細細者寒水雜以寒甚者曰勝出黃色

也又洪大者心火受制也

左尺按之至骨舉指來實者

壬癸俱旺也

六

脈按之俱空虚

下焦無陽也

先以輕劑去其中焦寒濕兼

退其洪火服理中湯

白朮 乾薑 炙甘草 人參 茯苓

除寒濕  
各五錢

右件為細末每服稱二錢水一盞半煎至一盞冰之  
冷寒服之謂之熱因寒用其寒以對足太陽之假熱  
也以乾薑之辛熱以瀉其寒也故曰真對真假對假  
若不愈當以朮附湯冰之令寒以補下焦元氣也

黃耆白朮湯

出試  
効方

治婦人四肢沈重自汗上至頭際頸

而還惡風頭燥熱

黃耆

一兩

白朮

半兩

黃蘗

酒製  
二錢

細辛

二分

川芎

半錢

吳茱萸

半錢羌活二錢五味子三錢人參半錢炙甘草二錢當歸身一錢

半柴胡一錢升麻一錢

右件咬咀每服半兩水二大盞入生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前腹中不快加炙甘草一錢汗出不止加黃蘗一錢

療胸脇肢滿者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不

來治之方

素問云  
出本草

以烏鰂魚骨蘆如二物并合之丸以雀卵大如小豆  
以五丸為後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也注云  
飯後藥先謂之後飯按古本草烏鰂魚骨蘆茹等並  
不治血枯然經法用之是攻其所生所起耳

魏志華佗治婦人長病經年世謂為寒熱注病冬月中  
佗令坐槽中平旦用冷水汲灌云當滿百始七十灌  
冷戰欲死佗令滿數至八十灌熱氣乃蒸出囂高二



三尺滿百灌佗乃使然火溫牀厚覆衣良久汗洽出

著粉便愈

出鳳科  
集驗方

烏金散

出朱氏  
集驗方

治婦人諸般發搐

真川墨乃松烟也磨酸醋緩緩啜兩呷即効婦人產  
後頭搖目不開服之便住次用豆淋酒一味封過一

宿次日兩服好

治婦人血噤失音衝惡

出本  
草

用鑰匙以生薑醋小便煎服弱房人煎湯服亦得

治因血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也

以諸血並生飲之

神仙濟陰丹 治婦人胎前產後一切積氣血塊血瘕

血瘕血暈血虛血悶血壅血崩血淋血霜赤白帶下  
月事不調臍腹疼痛腰膝沉重乾嘔惡心不思飲食  
五心煩熱四肢倦怠或寒熱嘔吐酸水頭目昏眩遍  
身隱痛坐卧不安經絡凝滯榮衛不調氣血虛弱變  
成血勞面黃體瘦夢中驚悸虛怯盜汗或產後有失

調理至天陰雨下渾身疼痛常服此藥升降陰陽溫  
煖血海或子宮久冷或少病三四十丸細嚼炊薑酒  
下立愈若室女經脈不行宜服之治腸風食毒下血  
不住槐花劉寄奴各等分為細末用米湯空心送下  
妙

敗薑 青皮 陳皮 三稜 蓬朮 烏頭

各一兩一升

已上六味先以米醋煮  
焙乾為度醋用二升 熟地黄 生地黄 赤芍

藥 當歸 白芍藥 劉寄奴 薑黃 肉桂

蒲黃

各半  
兩

右為細末醋糊為丸如桐子大每服三十丸空心薑

酒食前送下

治婦人口乾方

用黃龍肝一具燒灰酒下即安瘥

乾

龍

肝

普濟方卷三百二十八

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百

二十九  
三十

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣李大任

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十九

明

周王朱橚

撰

婦人諸疾門

崩中漏下

附論

夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脈虛損故也  
衝脈為經脈之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也  
手少陰心之經上為乳汁下為月水婦人經脈調適則  
月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非時而

下淋瀝而不斷謂之漏下也 蓋肝為血之府庫恚怒

勞役一或傷之肝不能藏血於宮官不能傳血於海所以崩中漏下漏下者淋瀝不斷是也崩中者忽然暴下乃漏證之甚者也其狀或如豚肝或成五色與血俱下又或如泔涕如爛瓜如豆汁如藍靛是也至有純黑如墨水與血相雜亦有純下瘀血者此皆衝任虛損恚怒勞役之過致傷於肝而然也久久不止頭暈眼花加之怔忡驚惕恐怖面肌瘦虛煩口乾臍腹冷痛吐逆不食



四肢虛困甚則為脹為腫診其脈寸口脈弦則為減大則為亢減則為寒亢則為虛寒虛相搏其脈為革主半產漏下又尺寸脈虛者漏血漏血脈浮者不可治治之之法調暢衝任鎮住血海溫和歸於有用內養百脈外為月事自無崩中漏下之患矣

五臟皆稟血氣血虛淋瀝漏下致五臟傷損五

臟之色隨血同下若五臟皆虛損者則其色亦各隨血下診其尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏下赤白不止脈小虛滑者生脈小緊實者都近死也又漏血下赤白或下血數升脈急疾者死遲者生也至於崩中五色隨崩俱下其狀白崩形如涕赤崩如紅藍汁黃崩形如爛瓜青崩形如藍靛黑崩形如豆汁與敗血

相雜而下也婦人白崩者是勞傷胞絡而氣極所為肺主氣氣極則肺虛冷也肺臟之色白虛冷勞極其色與胞絡之間穢液相挾夫婦人崩中者由臟腑傷損衝脈崩傷而下為白崩也

任脈血氣俱虛故也衝任之脈為經脈之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調適經下依時若勞動過多致臟腑俱傷而衝任之氣虛不能約制其經血故忽然暴下謂之崩中暴下診其寸口脈微遲尺脈微絃寸口脈微寒在上焦但吐爾今尺脈微絃如此即小復痛引腰脊痛者必下血也夫漏下

者血寒之極所致若謂以血熱致崩而用涼藥誤矣每用歲丹作効始進三五粒而未愈再進十粒尤未愈服至四五十粒差愈服至百粒方乃作効此歲丹之力也然歲丹之性全恃火力如水寒成冰血寒成塊血得溫則流散四肢永得日則烘消成水血凝得丹而流暢火力也大抵醫者意也以意醫之所以作効儻或凝而未散即用先進陽起石丸服之二日未効却進歲丹庶無可疑者也又有室女二七天癸當至而未至近十

八九左右方行者有卒然暴下漸至淋瀝不止有若崩漏者却又不宜服前藥也惟當以四物湯加香附子煎血色鮮而不止者挾熱也宜去熟地黃加生地黃煎臨病之際又在乎審處之下部出血不止謂之崩中穢液常流謂之帶下崩中失血多因衝任虛損榮道受傷得之冷帶雜下多因下焦不固內挾風冷得之崩中者投以當歸川芎香附諸黑藥之屬血暫止而終不止帶下者投以熟艾餘糧牡蠣海螵蛸之類帶暫歇而終不歇

者經曰衛氣者所以溫肌肉充皮膚肥腠理司開闔衛氣若虛則肌肉不溫皮膚不充腠理不肥而開闔失其司耳况胃為血海水液會焉胃者中央之土又所以主肌肉而約血水也衛氣與胃氣俱虛則肌弱而膚空血之與水不能約制是涓涓漏卮休作無時而不暫停矣然則調之止之不可不加意於固衛厚脾之劑此桂枝附子湯以之固衛而人參白朮茯苓草朮木香以之厚脾二者俱不可闕也病人者好炙燂亦有協熱而下血

者此則黃連丸輩所不可無肺絡脈微亦主帶下此則  
草菓白朮雖可燥水仍須以阿膠佐之若夫帶之為患  
出於風冷停宿官桂乾姜細辛白芷先與散其寒邪然  
後為之封固所貴擇之精而用之審云一應婦人大小  
產及諸下血新差未得經久遽觸房事皆作崩中漏下  
二帶之疾又有月事久閉纔得一通下部為風邪所搏  
致使敗瘀出而未盡亦作崩中漏下黃水或粉紅滲漏  
無時其崩中下血不止者震靈丹三粒陳米并香附煎

湯食前送下又方人參白朮炮乾薑炒甘草製半夏縮砂香附木香等分薑棗煎服又方圓半夏剉碎以薑汁和麪捏餅包裹炙令香熟去麪取半夏末之糯米稀糊丸麻子大每服五十丸芎歸湯沉香降氣湯各半食空

送下此皆止血之勝藥

儒門事親書論云凡婦人血崩或乍及四十已上因悲哀太甚

致然內經曰悲哀太甚則心系急心系急則肺火降而上焦不通熱氣在中故經云血崩下心系者血山崩也如久而不愈則面黃肌熱瘦弱慎不可以熱治之蓋血得熱而散故禁之宜以當歸等藥治之凡婦人年五十以上經血暴下婦人經血終於七七之數數外暴下者此乃內經所謂火主暴崩亦因暴喜暴怒憂愁驚恐致然慎

勿作冷痛治之如下峻熱藥治之必死止宜黃連解毒湯以清上更用連殼棕毛以滌其下然後用四物湯玄胡索散涼血和經之藥仁齋直方論云素問陰虛陽搏謂之崩此即血得熱則宣流之意也四物可以助陰生津枳殼散可以抑陽其間更以茯苓二陳湯和之使陰陽兩得其平血自循於經絡矣若夫衝任不固下元久虛以致血無關鎖則用參湯加當歸木香嚙下震靈丹為妙治漏血不止新傷胎及產後餘血不消作堅使胞門不閉淋澀惡血經踰日月不止者未可以諸斷血湯宜且與壯丹丸散等待血涼堅凝後所患淋澀便自止亦漸消少也此後有餘湯斟酌煎服此乃可作諸主治耳婦人產後去血多傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛心悶眩日月角重目睛耳聾舉頭便沉悶欲倒宜且煮大當歸芍藥各三兩以水四升煮取二升去滓分二服即定展轉續次合諸湯治之



方

地榆散

出聖惠方

治婦人崩中漏下不止

地榆

一兩判

伏龍肝

一兩半

白茯苓

一兩

柏葉

一兩微炒

蒲黃

一兩

白芍藥

一兩

甘草

半兩炙微赤判

鹿角膠

一兩

搗碎炒令黃燥

當歸

三分判微炒

桂心

半兩

芎藭

三分

乾薑

半兩炮裂判

漏蘆

一兩

蟹爪

二兩微

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓每於食前溫服

柏葉散

出大金  
良方

治婦人崩中漏下不問年月遠近漸加

黃瘦四肢無力腹內疼痛不思飲食

柏葉

續斷

川芎

當歸

生乾

地黃

龜甲

一作鱉甲各一兩半

禹餘

糧

二兩  
半

阿膠

赤石脂

牡蠣

地榆

艾葉

鹿茸

各一  
兩

右為末每服二錢食前粥飲調下一方有丹參如

鹿茸數煉蜜丸如桐子大每服三四十丸空心溫

酒吞下或沸湯下

禹餘糧散

出聖惠方

治婦人崩中漏下不止漸加羸瘦四肢

煩痛

禹餘糧

二兩燒醋洗十七遍

甘草

三分炙微赤剉

赤石脂

二兩

龍

骨

二兩

芎藭

三分

白芍藥

三分

附子

一兩炮裂去皮臍

熟乾地黄

一兩

乾姜

半兩炮裂剉

當歸

一兩微炒桂心半兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

黑金散

出醫方大成

治婦人血氣虛損經服不調崩中漏下

鯉魚皮

乾薑

炮

破故紙

黃牛角鰓

椶櫚皮

亂髮

各一兩

烏賊魚骨

熟

乾地黄

當歸

洗焙

木賊

各半兩

右剉碎拌勻入在瓷瓶內鹽泥固濟候乾以炭火  
五斤煨令通赤煙盡取於土內埋令冷取出研細  
每服三錢入射香少許米飲空心下

斷下湯

出楊氏家藏方

治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每遇

月候將行臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下

三十六疾悉能療之

人參

去頭

烏賊魚骨

燒灰

當歸

洗三味各二兩

熟乾地

黃

燒焙一兩

艾葉

醋炒一兩

阿膠

蛤粉炒成珠子七錢半

乾姜

半兩炮

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服

食前

補宮丸

出楊氏家藏方

治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸

崩中帶下並不宜服之

鹿角霜

白茯苓

香白芷

白朮

烏賊魚骨

白薇

白芍藥

牡蠣煨

山藥各等分

右為末麪糊丸桐子大每服五十九丸米飲空心送

下

鹿茸散

出聖惠方

治婦人崩中漏下不止虛損羸瘦

鹿茸

二兩去毛酥炙微黃

鱉甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

烏賊魚骨

一兩炙黃

白龍骨

一兩

續斷

一兩

熟乾地黄

一兩

肉

茯苓

一兩半酒浸一宿刮去皺皮炙乾

白芍藥

一兩

白石脂

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治婦人崩中漏下不止羸乏宜服此方

出聖惠方

烏賊魚骨

一兩燒炭

芎藭

三分

熟乾地黄

一兩

乾薑

半兩炮

當歸

二兩剉微炒

阿膠

三分搗碎炒令黃燥

艾葉

一兩微炒

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至

五分去滓入酒一合更煎一兩沸每於食前溫服

治崩漏

出危氏方

右用四物湯一兩人參二錢茱萸一錢每服半兩

棗煎服食前五六服寒熱腹痛皆退崩漏未止  
續服後熟附丸

當歸

一兩

川芎

一兩

赤石脂

半兩  
煨

木賊

去節  
半兩

熟

附子

半兩

龍骨

半兩  
煨

右為末醋糊丸如梧子大每服六十丸或五十丸  
米飲吞下曾記一婦人年五十已上經斷七年忽  
然經行遂成崩漏發熱腹痛兩月不差余診其脈  
虛細疾數余令服此數劑而愈



阿茄陀丸

出大全良方

胡椒

紫檀

鬱金

茜根

小蘗

皮

乃山石榴皮也

右等分為細末滴水丸如桐子大阿膠湯化下二  
丸方論云若經候過多遂至崩漏色淡如水但得  
溫則煩甚者至於昏悶其脈數小者為順洪大者  
為逆此由陰衰為邪熱所搏致傷衝任血得熱則  
流散譬如天氣暑熱則河水沸溢陽傷於陰令人

下血當補其陰宜服阿膠朮丸小薊湯

小薊湯

出大金  
良方

治陽傷於陰令人下血前所謂天暑地

熱經水沸溢當用此藥

小薊葉

洗切研取  
汁一盞

生地黄汁

一盞

白朮

半兩  
剉

右入水一盞煎至一半去滓溫服或用小薊莖葉

黑金散治婦人血氣虛損經事不調多因氣滯不散月  
水過多崩中漏下不止

香附子

一兩

香白芷

三錢

蓮蓬殼

十個

糊刷

二個

敗棕  
亦可

右為細末每服二錢用米飲調下或霹靂酒亦得  
不拘時候右四味通要炒焦黑留性

滋榮丸

出危氏方

治勞傷過度致傷臟腑衝任氣虛不能約  
制或暴下崩中或下鮮血或瘀血連日不止淋瀝不斷  
形羸氣劣倦怠困乏並皆治之

赤石脂

海螵蛸

側柏

右為末醋糊丸梧桐子大每服三十丸飯飲送下

空心日三服神効一方為細末每服二錢用熟飯

飲調下日三服名滋血湯

治婦人崩中漏下久不差宜服方

出聖惠方

白芍藥

槲葉

烏賊魚骨

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲下一錢

生地黃湯

出聖惠方

治崩中漏下日去數升

生地黃

細辛

等分

右咬咀以水一斗煮取六升服七合久服佳

治崩漏下血

用益智去皮炒過為細末食前米飲調下二錢立止一方用鹽米飲調下一方用益智子末酒調皆愈

加減四物湯

出濟生方

治室女二七天癸至亦有當時未至

而後至者有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多變生諸證悉宜服之

川當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

香附子

等分

右呔咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓食前溫服如血色鮮而不止者去熟地黃加

生地黃煎

延齡護寶丹

出保慶集

治婦人血臟虛損經候過多每行時

暴下不可禁止因成崩中連日不斷致五臟空虛失色黃瘦崩竭暫止日少復發不耐動搖小勞輒劇此藥但澄心服必有大効

禹餘糧石

二兩燒醋洗十七遍

人參

桂

赤石

脂

紫石英

研

杜仲

去粗皮  
剉炒

熟乾地

黃

續斷

桑寄生

吳白芷

芎

窮

當歸

剉炒

遠志

去心

金釵石斛

去根  
剉炒白

茯苓

去皮

阿膠

炒

牡蠣

燒

五味子

艾

葉

炒已上  
各一兩

右同為細末煉白沙蜜和丸如桐子大每服四五  
十丸溫粥飲下空心食前

增損禹餘糧丸

出千  
金方

治女人勞損因成崩中狀如月經

來去多不可禁止積日不斷五臟空虛失色黃瘦崩竭  
暫止少日復發不耐動搖小勞輒極治法且宜與湯未  
宜與此丸也發時服湯減退即與此丸若是疾久可長  
與此方

禹餘糧 龍骨 人參 桂心 紫石

瑛 烏頭 寄生 杜仲 五味子

遠志 各二兩 澤瀉 當歸 石斛

茯苓 乾薑 各二兩 蜀椒 牡蠣 甘草



各一  
兩

右為末密丸桐子大空心酒下十丸漸加至二十

丸日三服一方無乾薑

涼血地黄湯

出臍生  
拔萃方

治婦人血崩不止腎水陰虛不能

鎮守包絡相火故血走而崩也

生地黄

半錢

當歸尾

半錢

黃連

黃蘗

知母

藁本

川芎

升麻

各二分

柴胡

川羌活

防風

各三分

黃芩

炙甘草

二分

細辛

荊芥穗

蔓荊子

各一分

紅花

少許

右呿咀都作一服水三盞煎至一盞去滓稍熱服  
空心食前

牛角鰓散治婦人崩中下血不止

牛角鰓

二兩燒灰

白礬

二兩燒汁盡

橡實

一兩

木賊

一兩

芎藭

一兩

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒下二錢

治室女血崩不以冷熱皆可服

荊芥

蓮房殼

等分各  
燒作灰

右為細末每服二錢空心米飲調下

治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

白芷

牡蠣

龍骨

芍藥

赤石

脂

阿膠

當歸

川芎

鱉甲

烏賊骨

人參

各六分

艾葉

四分

乾地黄

八分

訶子

四分

乾薑

黃耆

各五分

右為細末空心酒調服方寸七

大牛角中仁散治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沉  
重虛極

牛角

一枚  
燒

續斷

乾地黄

桑耳

白朮

赤石脂

礬石

乾薑

附

子

龍骨

當歸

各三兩

人參

一兩

蒲黃

防風

禹餘糧

各二兩

右治篩以溫酒末食服方寸匕日三不知稍加

治崩中下血出血一日即斷或月經來過多及過期不  
來者服之亦佳方

吳茱萸

當歸

各三兩

芍藥

人參

芍

藥

牡丹

桂心

阿膠

生薑

甘草

各二分

半夏

八兩

麥門冬

一升

右㕮咀以水一斗煮取三升分為三服

治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立

芍藥

白芍

黃耆

龜甲

川芎

烏賊骨

各八分

生乾地黄

牡蠣

五色龍骨

乾薑

各十分

桂心

六分

附子

五個炮

右為細末空心酒調方寸匕

婦人崩中無問近久悉皆治之

伏龍肝

一斤

小薊根

桑寄生

續斷

地榆

艾葉

各三分

阿膠

當歸

赤石脂

厚朴

各二兩

生薑

五兩

右切以水一斗煮取三升絞去滓分作三服忌如

常法

白芍藥散治婦人崩中下血不斷淋瀝連年不絕黃瘦

白芍藥

一兩

牡蠣粉

一兩

熟乾地黄

一兩

白朮

三分

麒麟竭

三分

柏子仁

三分

烏賊魚骨

一兩  
炙黃

附子

一兩炮裂  
去皮臍

桂心

一兩

黃耆

一兩  
剉

龍骨

一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

治婦人忽暴崩中下血不斷或如鷄鴨肝者方

小薊根

六兩

當歸

阿膠

續斷

青

竹茹

芎藭

生地黄 八兩

地榆

金

月下土

各四兩  
絹裏

馬通

一升赤帶用赤  
馬白帶用白馬

右咬咀以水八升和馬通汁煮取三升分三服不止頻服三四劑未全止續服後續斷丸

續斷

甘草

地榆

鹿茸

小薊

根

丹參

各三  
十銖

乾地黄

三兩  
半

芎藭

赤石

脂

阿膠

當歸

各一  
兩半

柏子仁

一兩一  
作柏葉

龜

甲

秦牛角鰓

各三兩  
剉炒令黑



右為末蜜丸桐子大空心以酒服十九日二後加至三十丸

十灰丸治崩中下血不止

錦灰

黃絹灰

馬尾灰

艾葉灰

藕節灰

蓮蓬灰

油髮灰

赤松皮

灰

棕櫚灰

蒲黃灰

右等分為細末用醋煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九加至一百丸空心米飲送下

十灰散治下血不止

錦片

木賊

棕櫚

柏葉

艾葉

乾漆

鯽鱗

鯉鱗

血餘

當歸

右逐味火化存性各等分為末和合入射香少許

溫酒調服

柏子仁湯

出產  
生方

治婦女憂思過度勞傷心經心主於血

心虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸

去蘆酒浸

芎藭

茯神

去木

小草

阿膠

剉蛤粉炒成珠

鹿茸

燎去毛酒蒸焙

柏子仁

炒各一兩

香附子

炒去毛二

兩

甘草

炙半兩

川續斷

酒浸一兩半

右呔咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去

滓空心食前溫服

金華散

出大金良方

治婦人血室有熱崩下不止服溫劑不

効者

延胡索

瞿麥穗

當歸

乾葛

牡丹皮

各一兩

石膏

二兩

桂心

別為末三分

蒲黃

半兩

葳靈仙

三分一方加薑二片煎

右為細末每服二錢煎至六分空心溫服日二服  
一方用蔓荊子生薑各半兩搗爛炒小酒煎服凡  
血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可一槩用藥  
僕常療一婦人崩漏暴下諸醫投薑桂附子等藥  
服之愈甚召余診之六脈緊數遂用此藥兼局方  
就雞蘇丸數服即安本事單用黃芩者亦此意也

鹿茸丸

出醫方大成

治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸

少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脈微小由衝任虛衰為風冷客乘胞中氣不能固可灸關元柏壯在臍下正中三寸

鹿茸

燎去毛酥炙

赤石脂

禹餘糧

製各一兩

艾葉

一方

無艾葉

柏葉

附子

炮各半兩

熟地黄

洗焙

當歸

續斷

各二兩

右為細末酒糊為丸如桐子大空心溫酒下三十

丸一法用蜜丸亦可

伏龍肝散

出大全良方

治忽崩中血不止結作血片如雞肝

色碎爛

芍藥

十二分

阿膠

青竹茹

各八分

續斷

地

榆

小薊根

各十分

當歸

六分

生地黄

伏

龍肝

各十二分

右用水九升煮取三升去滓分作三服先服此藥後

服補藥九子

阿膠

鱉甲

川芎

當歸

赤石

脂

丹參

各六分

甘草

鹿茸

各五分

龍骨

十一分

分 龜甲

十分

續斷

地榆

四分

烏賊骨

八分

右為末煉蜜丸如桐子大空心酒下二十丸日二服常煮小薊汁服之尤佳一方阿膠丸用鼈甲芎藭續斷鹿茸各五分龍骨一兩半地膽四分烏魚骨八錢丹參六錢龜甲十分右為末醋麪糊為丸如桐子大每服三十九丸艾湯下日進三四服

伏龍肝散

出聖惠方

治婦人崩中下血不止遠臍搗撮疼痛

或時心煩

伏龍肝

一兩細研

麒麟竭

半兩

地榆

一兩剉

椶櫚

二兩燒灰

龍骨

一兩

當歸

一兩剉微炒

白芍藥

二兩

熟乾地黄

一兩

禹餘糧

二兩燒醋洗十七遍

右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢

伏龍肝散治婦人血崩不止或作片者

芎藭

一錢

地榆

薊根

伏龍肝

各七錢

青竹



茹八錢

右為細末每服三錢水二盞半煎至一盞溫服不

拘時再服前阿膠丸

艾煎丸

出拔  
萃方

治崩傷淋瀝小腸滿痛常服補榮衛固經

脈

方見本門月  
水不調類

琥珀散

出大全  
良方

治崩暴下血

赤芍藥

香附子

大者

荷葉

枯

男子髮

皂

水當歸

去蘆頭  
鬚洗淨

焙乾

棕櫚

炒焦  
存性

烏紗帽

是  
漆

沙頭巾取陽  
氣衝上故也

右等分除棕外其餘並切粗片新瓦上煨成黑炭  
存性三分為細末每服三五錢空心童子小便調  
下如人行十里再進一服即止如產後血去多加  
米醋京墨麝少許大率治血崩先用此譬如治痢  
有積不先去之徒服斷下藥一時暫止久則毒氣  
愈深甚至危殆血崩乃經脈錯亂不循故道淖溢  
妄行一二日不止使有積瘀之血凝成窠白更以

藥澁任轉見增劇宜先以五積散加醋煎一二服  
次服靈脂散及順氣藥去故生新自能平治

五靈脂散

出大全良方

治婦人血山崩及治丈夫脾積氣

右用好五靈脂炒令煙盡為末每服一錢溫酒調  
下此藥兼能解藥毒及蛇蝎蜈蚣咬塗傷處立愈  
每一服三錢水酒童子便各半盞煎至八分通服  
各抽刀散治產後有病服三服散惡血或心腹脇  
肋脹痛不可忍者或只用童子小便尤佳或中風

即入草烏頭半錢重同煎亦治腸風下血如不能  
飲酒者煎烏梅柏葉湯調下怒煩口乾渴者加蒲  
黃炒減半用一方燒存性霹靂酒調下然此藥氣  
惡難喫燒之存性極妙一方治婦人經血不止加  
當歸兩片酒一鍾與藥末同煎服昔親戚黃守正  
卿為和劑局日內子凌夫人忽苦此疾危殆百藥  
不動偶得此方旋即安愈

奇効四物湯治有熱久患血崩

當歸

頭尾用

熟乾地黄

洗焙

白芍藥

大川芎

半兩

大艾葉

阿膠

蛤粉炒如珠子

黃芩

出爛者各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎空心溫服

有一醫療血崩咬咀藥鋪市藥其方則四物湯加阿膠大艾也就鋪分作八服又向鋪索黃芩半兩加在藥內鋪家問醫者曰此藥何為加黃芩醫曰非汝所知吾與此藥正以黃芩為主夫心主血血得熱則行得寒則止病者一服而愈服盡八服至今無恙兩見數婦血崩症亦類此醫乃以黃連解毒湯加大艾治之不効是又當量其虛實用之

阿膠散治婦人崩中下血經七八日不定或作血片或

如豆汁腹內疔刺疼痛

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

訶梨勒皮

一兩

乾薑

三分炮裂對

蜜

陀僧

半兩細研

附子

三分炮梨去皮臍

梭欄

二兩燒灰

補骨脂

三分

微炒

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢  
千金散治婦人血崩不止

熟地黄

一兩

生地黄

乾刺薊

蒲黃

各半

兩芍藥

當歸

川芎

各一兩

右為粗末每服四錢酒一盞半煎至七分去滓溫服食前日進三服

密陀僧散治婦人血山崩下過多不止黃瘦臍腹痛痞

阿膠

碎炒一兩

破故紙

炒七錢

乾薑

炮七錢

密陀僧

一兩

棕皮

燒灰二兩

訶子皮

一兩二錢

右為末每服三錢五錢熱酒調下濃煎艾湯亦得  
當歸湯治崩中血虛羸方

當歸

芎藭

黃芩

芍藥

甘草

各二  
兩 生竹茹 二升

右咬咀以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥煎  
取三升半分三服忌勞動嗔怒禁百日房事

丹參酒治崩中去血及產後餘疾方

丹參 艾葉 地黃 忍冬 地榆

各五  
斤

右剉先洗臼以水浸三宿出滓煮汁黍米一斛炊  
飲釀酒酒熟酢之初服四合後稍添之



狼牙散治婦人崩中下血不止心胃虛悶

狼牙草

三兩

訶梨勒皮

三分

白芍藥

三分

白朮

三分

黃耆

三分

剉

右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治崩中去血積時不止起死方

肥羊肉

三斤

乾薑

當歸

各三兩

生地黃

二升

右咬咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁

及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之  
當歸散治婦人血崩不止者四十歲已上亦可服

當歸

一兩

龍骨

一兩  
燒赤

香附子

一兩  
炒

棕毛灰

半兩

右為末每服四錢空心酒飲湯下忌油膩雞豬魚  
兔等物

半夏丸治吐血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿虛腫亦  
消宿瘀百病通用用圓白半夏刮淨槌扁以生薑汁調  
和飛白麴作軟餅包拚半夏慢火炙令色黃去麴取半

夏為末米糊丸如菰豆大用三四十丸溫熱水下

治女子血崩及產後血不止月經來多取細椿木棍一大握東引者洗之以水一大升煮分再服便斷亦止帶下

白崩以芎歸湯加南木香下震靈丹

治婦人血海敗以佛尼降真二兩剉碎每服水一大碗煎至半碗空心連進二服

四仙丸治崩中夫崩中者由勞傷過度使臟氣俱傷衝

任俱虛不能攝養致思慮過度而為之崩產後血為經  
血經血既傷臟氣既損不能將養不慎勞役早則生虛  
體不任遠使經血暴下謂之崩凡崩中帶下而別無所  
若宜與鶴頂丸主之苦小腹急滿痛者難治內有瘀血  
也故切勿止之止則復滿愈加不可治宜先與四仙丸  
後與鶴頂丸既崩而淋瀝不斷血弦於內也以四仙丸  
去其血然後鶴頂丸治之

桃仁

去皮尖

當歸

大黃

醋浸炙

水蛭

石灰炒各一兩

右為末醋糊為丸梧子大每服三十丸空心醋湯下

二氣丸治漏下者因氣損耗故衝任之脈因此虛矣以致經不得依時淋瀝不絕為之崩及產後諸疾俱由是也鶴頂丸俱宜服之妊娠漏下血者名曰胎漏月經忽行蓋血養胎非時而行皆氣衰而不能納在經也如便來有如經或因傷動而漏下乃服二氣丸鶴頂丸止之不止則胞乾子損矣

艾葉

一兩醋浸一宿煮乾為度

阿膠

半兩對炒令沸

右為細末醋糊為丸梧桐子大每服五十丸空心

粟米湯下

鶴頂丸治帶下之證有三未嫁之女月經初來尚未曾止或浴之以冷或熱而扇或當風此室女病帶下之由有家之婦陰陽過多即傷胞絡風邪乘虛而入胞經觸冷遂使穢液與血水相連此婦人帶下之由產後帶下由亡血失氣傷動胞絡門開而外風襲肌體虛冷風入冷風無熱

氣相連故成液而下冷則多白而熱則多赤冷熱相交  
赤白俱下鶴頂丸治之

艾葉

一兩醋半盞  
煮乾為末

牡蠣

一兩三錢  
鹽泥煨

赤石脂

一兩  
半醋

淬七

吳茱萸

湯淋泡  
數次

乾薑

一兩半  
炮裂

龍骨

一兩鹽  
泥煨

當歸

七錢半  
酒浸

附子

半兩炮  
去皮

右為細末醋糊丸梧桐子大以赤石脂為衣每取  
五十九丸用艾葉鹽湯烏梅煎服空心下

治婦人血崩屢効方

出大全  
良方

當歸

白芍藥

乾薑

棕櫚

各等分

右各煨存性碾為細末稱過醋湯調以有節朱筋在四十九轉食前服之仍與炒黑香附子丸

當歸散治血崩

當歸

白芍藥

香附

炒

棕毛灰

五錢

右各等分為末米飲湯調下食前一服無棕毛灰當歸湯治婦人下血不止腹痛

當歸

焙半兩

柏葉

一兩

薤白

六莖切

禹餘糧

三分煨醋淬三



遍研末

右先將三味咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分下餘糧細末一錢煎沸去滓空心溫服治婦人血山崩

百草霜

血餘灰

棕櫚燒灰

蓮蓬

燒灰

合用碗

右各等分用無根水一盞送下每服五錢空心服棕櫚散治婦人崩中下血數升氣欲絕宜服

棕櫚

三兩  
燒灰

紫參

一兩

麝香

二錢  
細研

伏龍肝

一兩  
細研

右件藥搗細羅為散入麝香研令勻不計時候以

熱酒調下二錢

薤藥散

出聖  
惠方

治婦人崩中下血不止

白薤藥

一兩  
細研

柏葉

一兩  
微炙

柏樹細皮

一兩  
炒黃

茜根

一兩  
剉

右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢

桑耳散

出聖  
惠方

治婦人崩中下血不止漸加虛困黃瘦

桑耳

二兩  
微多

阿膠

一兩搗碎  
炒令黃燥

茜根

一兩  
剉

熟乾地黃

二兩

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下二錢

通神散

出聖  
惠方

治婦人崩中下血不止

拔蒜

一兩  
剉

蛇床子

一兩

木賊

一兩

桑蛾

一兩  
微炙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下

二錢

治婦人崩中連日不止

出大全  
良方

熟艾

如鷄子大

阿膠

半兩

乾薑

一錢

右為粗末用水五盞先煮艾薑入膠消烱溫服分

二服空心服一日服盡

又方

出大全良方

牛角鯁

烏賊骨

各一分

麝香

一錢

右為細末入麝香令停酒調下一錢一日二三服

備金散

出拔萃方

治婦人血崩不止

香附子

四兩炒

當歸尾

一兩二錢

五靈脂

一兩炒

右細末每服秤五錢醋調空心服立効

黃葉湯

出危氏方

治血崩

黃連

三錢

黃蘗

黃芩

各一錢

右用水四盞煎取二盞去滓入炒阿膠末半錢再煎分作三次空心溫服如腹痛加梔子同煎

治血崩

出經驗良方

棕毛

垢膩髮

千里馬

即草鞋後半截

右各燒存性為細末勿令病者見合此藥酒調服

蒲黃散治婦人血山崩累驗秘方

破故紙

炒黃

蒲黃

炒

千年石灰

炒黃

右各等分為細末每服三錢空心用熱酒調服立

止

蓮殼散治血崩

棕毛

燒灰

蓮殼

燒灰存性  
味各半兩

香附子

二兩  
炒

右為末米飲調三四錢食前調下服之

治婦人血山崩

青箱子

夏蚕繭灰

棕皮灰

右為末用霹靂酒調下二錢空心服

治婦人血崩血敗

頭髮灰

陳棕灰

綿燒灰

右各等分每服三錢用米飲湯送下立效

治婦人崩中下血不止漸加虛困黃瘦

棕櫚皮

二兩  
燒灰

晚蚕沙

二分  
微炒

麝香

一錢  
細研

右件藥細研為散不計時候以熱酒調下二錢

又方

寒食麪

一匙炒

雀兒糞

一兩細研

乾薑

半兩炮裂剉搗末

右件藥用醋一大盞熬下二味如膏入炒麪和丸如小豆大每服不計時候以溫酒下十丸

治婦人崩中下血不止方

側柏葉

一兩微炒

芫花

一分醋拌炒令乾

大麻莖

十莖

右件藥搗粗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服



治暴崩中去血不止方

牡蠣

兔骨

各二兩  
半炙

右治下篩酒服方寸匕日三服

如神散治婦人血崩不止赤白帶下

香附子

赤芍藥

各等分

右為細末每服三錢鹽一捻水一盞煎至七分溫服無時候日二服十服見效

芍藥湯治崩中下血不止小腹痛

芍藥

一兩半  
炒黃

柏葉

六兩  
微炒

右水一升煎六合入酒五合再煎取七合空心分  
為兩服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等  
分炒燥為細末酒調服方寸匕治白帶臍腹疼痛  
面黃瘦悴

治崩中晝夜不止醫不能治

一名芎  
窮酒

芎窮

一兩

生地黄汁

二合

右先用酒五升煮芎窮一升去滓下地黄汁再煎

三二沸分為一二服不耐者漸進一方無地黃汁  
不飲酒者水煮亦得

治崩中去血不止

白茅根

三斤

小薊根

五斤

右細切用酒五斤煮取四升去滓分溫四服一方  
無白茅根一方無小薊根

治婦人血山崩不止

婦人油頭髮

燒半兩

千里草灰

半兩

右為細末每服三錢淋用煨秤錘酒調服

治婦人血崩過多不止

槐花 一兩 棕毛灰 五錢

右為散水一盞少許煎至七分去滓溫服

如聖無比散治血山崩不止

一名綠  
云散

晚蚕沙 一兩 伏龍肝 半兩

右同為細末酒調二錢

治血崩

棕櫚

不以多少  
燒存性研

牡蠣

火煨研  
如粉

右每服抄棕櫚灰一錢牡蠣半錢入麝香少許拌  
勻空心米飲調下又方用四物湯加側柏葉阿膠  
大艾煎服

治血崩

椒目

焙為末

綿子

燒灰各  
等分

右每服三錢空心用鹽酒調下

治婦人經年血崩

出經驗  
良方

香附子

二兩  
炒赤

蓮殼

五箇燒  
存性

右為細末陳米飯飲調送震靈丹一十丸一日三

五服

烏龍丸治婦人血崩

百草霜

細糕

右為丸麝香作衣每服五十丸空心鹽湯送下

陽起石丸

出濟  
生方

治衝任不交虛寒之極崩中不止變生

他證

陽起石

火煨紅別研  
令極細二兩

鹿茸

去毛醋  
炙一兩

右為細末醋煎艾汁打糯米糊為丸如梧子大每服百丸空心食前米飲送下

狗膽煎治婦人經血不止崩暴下血

狗膽

一枚  
用汁

鎗墨

二錢鍋底  
面上煨是

右一處按拌分作兩服煎當歸酒調下

烏金散

出經效  
濟世方

治婦人血山崩累日不止

桑螵蛸

去桑枝  
子枰

黃明膠

槌碎

右等分拌勻於新方磚中焙乾為末溫酒下一錢

烏金散

出經  
驗方

治血崩不止

棕毛

燒灰存  
性一兩

真龍骨

右為細末和勻每服三錢好酒調下空心二服後  
即止

治婦人崩下血不絕小腹疼痛方

出聖  
惠方

牡蠣

二兩半  
燒為粉

狗頭骨

二兩半  
炙令黃

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢



治婦人崩中下血晝夜不止方

出聖惠方

阿膠

一兩搗碎炒令黃燥

蛇床子

三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下

一錢

治婦人崩中下血不止頭目暈悶心神煩熱宜服此方

出聖

惠方

晚蚕沙

一兩微炒

白堊

一兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下

一錢

又方

出聖惠方

棕櫚

五兩燒灰

麝香

二錢

右件藥同細研為散每服不計時候以溫酒調下

二錢

獨聖散

出諸氏集驗方

治婦人血崩不止

用防風去叉蘆不以多少為細末酒煮白麴清調下二錢空心食前日二服更以麴糊作為丸酒投

之極驗

荊芥散

出醫方大成

治婦人崩中連日不止

用荊芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈就燈上  
燒荊芥焦色為細末每服三錢童便調下

治血崩不止

出大全良方

用五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓澄  
清再煎成膏入神麴二兩為末和丸如梧桐子大  
每服二三十丸溫酒送下空心服便止兼服四君

子湯加肉豆蔻并和氣藥本草五靈脂行血有功  
大能生補肝藏血入肝尤速

神應散

出大全良方

治婦人血崩不止

用桂心不以多少瓦鍋內煨微存性為末每服一  
二錢米飲調下

一方

出大全良方

治婦人血崩不止赤白帶下

用香附子去毛炒焦為細末用熱酒調下二錢放  
溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢如血崩不止

者亦能解之米飲調亦可許學士云治下血不止  
或五色崩漏當服滋血調氣是婦人仙藥也

治崩中晝夜不止醫不能治

出大全良方

以丁香二兩為細末用酒三升煮取一升空心頓  
服一方用丁香百顆酒煎服

治婦人血崩過多不止

一名芙蕖散  
出十便良方

以枯蓮蓬燒灰空心用淡醋湯下二錢一方以溫  
酒或米飲下食前

療崩中不止不問年月遠近

出聖惠方

用槐耳燒作灰為末以酒服之方寸匕一方作槐

蛾

治婦人崩中下血不止

以衣中白魚殭蚕等分為末并花水服之日三服  
差其魚多在衣書中俗名蠹魚也

治婦人崩中不止一用赤石脂為末酒調下

血崩

出鮑氏方

右用側柏將鹽炒淨瓦上燒槐花并五倍子為末  
童子小便調服

治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方

出千金方

用芎藭八兩呔咀以酒五升煮取三升分三服不  
飲酒水煮亦得一方為末每服五錢水酒各一盞  
同煎服

治崩中

出千金方

用桑耳燒令黑為末酒服方寸匕日二服亦治帶

下豉酒亦佳

又方

出千金方

用羊脰一具以酢煮去血服之即忌猪魚酢滑物犯之便死亦可治帶下

一方治崩中下血

出大金良方

崩中藥多是用止血藥及補

血惟此方治陽乘陰所謂天暑地熱經水沸溢者

用黃芩不以多少為細末每服一錢霹靂酒調下

一方荊芥煎湯下近朝有王御醫值夜忽有一官



女血如山崩其時暑月藥籠中只有大順散兩貼  
用冷水調服旋即奏效以此知醫要權變金華散

亦妙

一方治婦人血崩

出大全  
良方

用烏梅燒灰為末烏梅湯調下一方酒調皆愈

一方

出大全  
良方

用棕櫚白礬煨為末酒調下二錢服

綿砂散

出大全  
良方

治血崩

用新縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末米

飲調下三錢一方溫酒調服

治血崩方

出大全良方

用夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時候

治血崩

出神效方

用蚕沙不以多少為末每服三錢五錢熱酒調下

服之

獨聖散

出仁存方

治婦人血崩臍下冷痛

用良薑為末每服三錢濃煎艾湯調下空心食前

老婦人加大椒一兩臍下冷痛加五靈脂二兩作  
丸子服

治血崩

出經驗良方

用陳蘿蔔子炒赤細研一大錢陳皮飲下中年人  
弱者用四物湯加茱萸生薑肉桂

治婦人不問年老少經血妄行如崩

出經驗良方

取川椒目微炒去汗盡放地上出毒為細末用陳  
米一勺烏梅半箇煎湯服可安

梅飲子

出經驗良方

治婦人血崩

以鹽白梅七箇燒灰為末米飲作一服空心

治婦人積年血崩

出經驗良方

用草血竭嫩者蒸油鹽薑淹喫小酒嚥下或收為末薑酒調服血竭草生於磚縫井頭少在地上

一笑散治婦人血崩

用新綿一團燒灰研為細末用酒調服立止

治婦人血崩壯陽日過倍大補益主赤白下補精敗面

黑勞傷

出本  
草

用蓰蓉四兩水煮爛切細研精羊肉分四度五味

米煮粥空心服

治崩中血凝症者

出本  
草

取生胡麻一升搗內熱湯中絞取半升服立愈

治崩中血安胎止腹痛用艾葉醋煎服

治崩中及女子月候傷過

出千  
金方

取小薊根搗汁半升服之亦可酒煮服

治婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多而心痛甚者亦然此方治之

出大全良方

用炒烏賊魚腹內墨醋湯調下此魚腹中有墨汁若見人過必吐其墨以蔽其身一方用烏賊魚腹內墨以醋摩令濃服之如甚者炒墨醋調服之

治婦人血崩

以烏梅肥大者半斤用酸醋浸一宿取出去核研為膏加百草霜羅過共烏梅膏為丸如梧桐子大

每服三四十丸空心淡醋湯送下用進二服

一方治血崩

出神效方

以管仲去須剉碎用酒醋煎三錢煎至七分去滓溫服一服立止

治婦人血山崩

用駱駝毛燒灰為末每服二錢鹽酒調下神效

治崩中帶下

出本草

以鹿血和酒服之良

白堊丸

一名牡蠣丸  
出千金方

治女人三十六疾胞中病漏下不

絕

邯鄲白堊

禹餘糧

白芷

白石脂

乾薑

龍骨

桂心

藿麥

大黃

石韋

白欬

細辛

芍藥

甘草

黃連

附子

當歸

茯苓

鍾乳

蜀椒

黃芩

各半兩

牡蠣

烏賊骨

各一十錢

右為末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服不知加至十丸一方無蜀椒每服溫酒下三十丸



生乾地黄散治婦人血傷不止腰脚痠腫倦怠無力心煩渴燥面目虛浮

生乾地黄

焙

陳橘皮

去白炒

甘草

多對

白芷

醋石榴皮

牛角鰓灰

續斷

人參

地榆

剉炙各一兩

右為散每服二錢米飲調下食前日二服以止為度

伏龍肝散

出聖惠方

治婦人漏下或差或劇身體羸瘦飲食

減少四肢無力

伏龍肝 一兩

赤石脂 一兩

龍骨 一兩

牡蠣

一兩  
燒為

粉  
烏賊魚骨

一兩  
燒灰

餘糧

一兩  
燒醋  
滓七遍

桂心

一兩

白朮 一兩

黃牛角鰓

一兩  
燒灰

右件藥搗羅為散每於食前以溫酒調下二錢

代赭散

出聖  
惠方

治婦人漏下久虛乏弱

代赭 一兩  
燒醋  
滓三遍

附子

三分  
裂炮  
去皮劑

赤石脂

一兩

蒲

黃 半兩

鹿茸

二兩  
去毛塗  
酥炙微黃

當歸

一兩  
剉  
微炒

乾薑

三分

炮裂 三分  
對 芎藭 熟乾地黃 一兩

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢  
艾葉散治婦人漏下血淋瀝不斷身體黃瘦不思飲食

艾葉 炒

阿膠 炒令燥

赤石脂

龍骨 各一兩 縮

砂仁 半兩

附子

炮裂去皮臍

當歸

切焙

硫黃

各三分 熟

乾地黃

焙一兩半

吳茱萸

湯浸焙乾 炒半兩

右為散每服二錢米飲調下不拘時一方有芎藭

三分

赤石脂散

出聖惠方

治婦人漏下不止腹內冷痛

赤石脂

一兩

艾葉

三分微炒

乾薑

三分炮裂剉

慎火草

一

兩當歸

一兩剉微炒

鹿茸

二兩去毛塗酥炙令微黃

龍骨

一兩

阿

膠

二兩搗碎炒令黃燥

右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢

蛭蛸散

出經驗良方

治婦人漏下臍腹痛久而不止

以烏賊魚骨燒存性研為細末每服二錢煎木賊湯下不拘時候

治漏下神方

出千金方

取槐子燒末酒服方寸匕日三立瘥食前服一

方用槐花

膠艾湯

出和劑方

治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不

斷臍腹疼痛經血淋瀝不斷及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡淋瀝漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制延引日月漸或羸瘦

熟乾地黄

白芍藥

各四方

當歸

去蘆頭

艾葉

微炒

各三兩

阿膠

搗碎炒令黃燥

芎藭

甘草

炙各二兩

右為粗末每服三錢水一盞酒六分煎至八分去

滓熱服空心食前日三服病甚者連夜併服

烏金散治婦人血崩日久不止或經脈不斷或暴下血不止

烏賊魚骨

去甲

棕櫚

羊角尖

蠶退

新編

各一兩

白礬

半兩

乾薑

一分

右都入一瓶內用泥固濟候乾以大火煨通赤放  
冷取出細研入麝香一錢再研勻每服二錢溫酒  
調下空心食前服

龍骨散

出千金方

治婦人漏下不止或少或多遂致常漏身

體虛瘦飲食減少困怠無力

龍骨

竈中黃土

赤石脂

牡蠣

燒

研

桂

去粗皮

烏賊魚骨

去甲

禹餘糧

煨醋淬五七遍各一兩

右為散每服二錢溫酒或米飲調下空心日午臨

卧

馬通湯

出千金方

治漏下血積不止

赤馬通汗

一升取新馬屎絞取汁乾者水浸絞取汁

生艾葉

阿

膠

各三兩

當歸

乾薑

各二兩

好墨

半圓

右咬咀以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通

汁及膠微火煎取一升分再服相去如人行十里

久

蒲黃阿膠湯

一名蒲黃散  
出聖惠方

治婦人血漏非時而下淋瀝



不斷五色

蒲黃

微炒  
二兩

鹿茸

酒浸炙  
去毛

當歸

切焙各  
二兩

阿膠

炙令  
燥

烏賊魚骨

去甲各  
二兩半

生地黄

汁一碗一方用  
生乾地黄一兩

右除地黄外粗搗篩每服二錢水一盞地黄汁半

盞同煎取一盞去滓溫服空心日午臨卧一方為

細散溫酒調下二錢

慎火草散

出千金散

治漏下

慎火草

十兩熬  
令黃

當歸

鹿茸

阿膠

各四  
兩

龍骨 半兩

右治下篩先食酒服方寸匕日三

鹿茸散

出千金方

治婦人漏下不止

鹿茸

酒浸炙去毛

阿膠

炙燥

烏賊魚骨

去甲各一兩半

當歸

切焙

蒲黃

微炒各一兩

右為散每服二錢溫酒或米飲調下二錢

菴蘭飲治婦人卒漏下先多後少日久不斷

菴蘭子

微炒

熟乾地黄

焙

蒲黃

微炒

當歸

切焙

各二

兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

空心日午臨卧

蒲黃散

一名鹿茸散  
出千金方

治漏下不止

蒲黃

半斤

鹿茸

當歸

各二兩

右治下篩酒服五錢匕日三不知稍加方寸匕

蒲黃丸治婦人月候過多血傷漏下

蒲黃

三兩  
微炒

龍骨

二兩  
半

艾葉

一兩

右為末煉蜜和丸梧子大每服二十九煎米飲下

煎艾湯下亦得日再

赤石脂散

出聖惠方

治婦人漏下數年不差

赤石脂

一兩燒赤

側柏

一兩微炙

烏賊魚骨

一兩燒灰

右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢

治婦人血崩

出本草

以舊敗蒲席燒灰酒調下二錢

治婦人崩中吐痢血不止

出本草

取敗船茹乾煮之亦燒作屑服之

普濟方卷三百二十九